



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  
بهداشتی درمانی البرز  
معاونت غذا و دارو

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵  
شماره: ۱۴۰۴/ص/۲۰/۱۵۴۷۵  
پیوست: دارد

سرمایه‌گذاری برای تولید (مقام معظم رهبری)

ورود به دفتر نظام پزشکی شهرستان فردیس  
شماره: ۸۲۱، ۴۰۴  
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

معاونت محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان ...

ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان ...

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی ...

ریاست محترم انجمن داروسازان استان البرز

مدیریت محترم داروخانه هلال احمر

ریاست محترم داروخانه آموزشی دانشکده داروسازی

معاونت غذا و دارو  
۱۱/۲۹

موضوع: اطلاعیه شماره ۱۴۳ گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت با عنوان هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی ترکیبی بوپروپیون / نالترکسون

با سلام و احترام:

با عنایت به نامه شماره ۶۵۸/۷۴۳۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت، با موضوع "هشدار

در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی ترکیبی بوپروپیون / نالترکسون"، به پیوست اطلاعیه تخصصی شماره ۱۴۳ پایش ایمنی مصرف

فرآورده‌های سلامت، جهت استحضار و اطلاع‌رسانی مقتضی ایفاد می‌گردد.

دکتر مریم دانجی  
معاون غذا و دارو دانشگاه

نامه فوق بدون مهر فاقد اعتبار می‌باشد

آدرس: بلوار جمهوری شمالی، جنب زیر گذر پل شهدای روحانی، خیابان مسلم ابن عقیل غربی تلفن: ۳۴۲۱۱۱۴۱ : ۳۴۲۱۱۱۵۱

www.abzums.ac.ir - info@abzums.ac.ir



## اطلاعیه شماره ۱۴۳ دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

موضوع: هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف داروی بوپروپیون / نالترکسون

به اطلاع جامعه محترم پزشکی می‌رساند، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت، گزارش‌هایی مبنی بر عوارض ناخواسته به دنبال مصرف فرآورده قرص خوراکی ترکیبی بوپروپیون / نالترکسون، دریافت نموده است که با توجه به اینکه در بسیاری از موارد با به‌کارگیری نکات ایمنی توصیه شده در منابع علمی، احتمال وقوع عارضه ناخواسته در بیماران کاهش می‌یابد، موارد زیر را به اطلاع همکاران محترم می‌رساند.

### • مصرف بیش از حد تصادفی مواد اوپیوئید:

بیمارانی که با داروی نالترکسون درمان می‌شوند، ممکن است به دوزهای پایین‌تر مواد اوپیوئید نسبت به میزان مصرف قبلی پاسخ نشان دهند. این موضوع می‌تواند منجر به مسمومیت با مواد اوپیوئید شود که به طور بالقوه تهدید کننده حیات است. به بیماران هشدار دهید که هرگونه تلاش برای غلبه بر بلوک اوپیوئیدی در طول درمان با نالترکسون خطرناک است و می‌تواند به طور بالقوه منجر به مصرف بیش از حد کشنده مواد اوپیوئید شود. انسداد رقیابتی گیرنده مواد اوپیوئید که توسط نالترکسون ایجاد می‌شود، در حضور مقادیر زیادی از مواد اوپیوئید به طور بالقوه قابل برطرف شدن است. در صورت نیاز به درمان مزمن با مواد اوپیوئید، مصرف داروی ترکیبی بوپروپیون / نالترکسون باید متوقف شود. اگر نیاز به درمان متناوب با مواد اوپیوئید باشد، به طور موقت مصرف بوپروپیون / نالترکسون را قطع کنید و ممکن است دوزهای پایین‌تری از مواد اوپیوئید مورد نیاز باشد.

### • ترک حاد مواد اوپیوئید:

مصرف داروی بوپروپیون / نالترکسون ممکن است علائم ترک حاد را در بیماران وابسته به مواد اوپیوئید تسریع کند. برای بیمارانی که قبلاً به مواد اوپیوئید کوتاه اثر (از جمله ترامادول) وابسته بوده‌اند، حداقل ۷ تا ۱۰ روز فاصله زمانی بدون مواد اوپیوئید توصیه می‌شود؛ در بیمارانی که در حال تغییر رژیم درمانی از بوپرنورفین یا متادون هستند، فاصله زمانی بدون مواد اوپیوئید ۲ هفته را در نظر بگیرید.

### • سمیت کبدی:

مواردی از هپاتیت، اختلال عملکرد قابل توجه کبد و افزایش گذرا و بدون علامت ترانس آمیناز کبدی با مصرف نالترکسون مشاهده شده است. در صورت بروز علائم/ نشانه‌های هپاتیت حاد، درمان را قطع کنید. پزشکان باید توجه داشته باشند که افزایش ترانس آمینازها ممکن است ناشی از بیماری کبدی الکلی قبلی، عفونت هپاتیت B و یا C یا مصرف همزمان سایر داروهای هپاتوتوکسیک باشد. ترک ناگهانی مواد اوپیوئید نیز ممکن است منجر به آسیب حاد کبدی شود.

منابع: UpToDate 2025

اطلاعیه تخصصی دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت